DJO, LLC
Scharfeneckweg 41
30175 Hannover, Germany
MOSS GmbH
5919 Sea Otter Place, Suite 200
Carlsbad, CA 92010 - USA

EC REP

©2021 DJO, LLC

10A100 REV 00 2021-12-13

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

IF YOU ARE USING THE CRYO/CUFF WITH THE AIRCAST CRYO/CUFF IC UNIT BE SURE YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS LOCATED IN THE AIRCAST CRYO/CUFF IC INSTRUCTIONS FOR USE.

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. User should be able to read and understand instructions, warnings and cautions.
OPERATING PRINCIPLE: The AirCast Cryo/Cuff provides cold therapy and compression.
INTENDED USE/INDICATIONS: The Aircast Cryo/Cuff combines focal compression with cold to minimize swelling and pain.
FREQUENCY OF USE: A licensed health care practitioner must select the length of use and frequency of use depending on individual patients needs. Do NOT use this device if a prescription has not been provided to you or if you are not under the care of a licensed health care practitioner.
CONTRAINDICATIONS: Cryotherapy should not be used on persons with Raynaud's or other vasospastic disease, cold hypersensitivity, decreased circulation, cryoglobulinemia, hypercoagulable clotting disorders or other peripheral vascular diseases, peripheral edema or poor local circulation, local tissue infection, cold allergy, cold hypersensitivity, previous cold injury, paroxysmal cold hemoglobinuria. Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.
WARNINGS AND CAUTIONS:
- This device is not thought to cause serious injury, including tissue necrosis. You must be able to check your skin condition under the CUFF (DO NOT remove the CUFF to check your skin condition) frequently. People are sensitive to cold in diverse ways and may react differently to cold treatment. - Check for increased pain, burning, numbness, tingling, increased redness, discoloration, itching, excessive swelling, blisters, welts, irritation or other changes in skin condition under the Cuff or around the treatment area. If you experience any of these conditions, immediately discontinue use of the device and contact your physician. - Patient should not use this device for more than 30 min. at a time on a routine basis. Caution must be taken by routinely monitoring the patient during use on children, elderly, incapacitated patients, severe cardiovascular diseases, those with decreased skin sensitivity or circulation due to poor nutrition, medications (eg. beta blocker or epinephrine, narcotics), tobacco and alcohol use. If breathing problems occur outside the presence of the licensed healthcare professional, he or she must ensure that the patient or caregiver understands how much monitoring is to be conducted. - It is recommended that at least 20 minutes of cessation should be encouraged between 2 hour long cryotherapy sessions. - Do not apply the CUFF directly to the skin; apply a barrier (e.g. cloth or bandage) between the wrap and your skin, and do not wrap it around the ankle or wrist. No part of the wrap should be left loose for any period of time. - Check for moisture. If moisture is present on the CUFF, immediately discontinue use of the device. - Do not use an elastic wrap in conjunction with the Cryo/Cuff. - Dressings applied under the Cryo/Cuff should be applied lightly. - When filling the Cryo/Cuff, do not raise the cooler more than 15 inches (38 cm) above the CUFF to avoid excessive pressure. - Reduce pressure with any sense of discomfort, numbness or tingling of the limb. - The Cryo/Cuff is designed for one patient use only and may be used on the same patient for the length of treatment. - The device should be cleaned if it is used on the same patient for a prolonged period of time (see *Cleaning information*). - Keep small parts and packaging materials away from small children and animals. These parts present choking or suffocation or strangulation. - It could be unsafe to use accessories, detachable parts and components not described in this instructions, or otherwise modified equipment. - Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened. - Do not use without manufacturer and customer's authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:
1. **PREPARE THE CUFF** - Connect blue tube to cooler. Add water to line inside cooler, then add ice to top of cooler. Lay the insulation disk on top of ice. Attach cooler lid snugly. Allow 5 minutes with occasional shaking for ice to settle.
2. **APPLY THE EMPTY CUFF** - Close bottom flaps under foot. Place foot in cuff with heel against back of cuff. If necessary, adjust cuff width by repositioning bottom flaps. Wrap foot cover around foot and secure with straps (Fig. 1). Wrap ankle cover around ankle and secure strap (Fig. 2).
3. **FILL CUFF** - Connect blue tube to the cuff, listen for a click/snap. When using the Gravity Cryo/Cuff (non-motorized), open air vent on cooler lid and raise cooler more than 15 inches (38 cm) above the cuff (Fig. 3). If the cooler is raised more than 15 inches (38 cm), the cuff will increase in weight and may cause discomfort. Hold raised cooler for 30 seconds while cuff fills. Close air vent on cooler lid. The cooler can then be disconnected from cuff by pressing the metal tab on the quick-disconnect while cooler is raised.
4. **RECHILL WATER** - Reconnect the blue tube to cuff, lower the cooler behind the patient and refill with cold water and ice. Close the lid of the cooler. Allow a minute or two for the water to mix with the ice and recirculate. Fill cuff as in step 3 and reattach. Then raise the cooler and repeat the filling process (see *step 3*).

CLEANING INSTRUCTIONS: After use, completely drain water from cuff, tube, and cooler. To drain tube, elevate tube while pressing tip of quick-disconnect. Use only cool water to clean cuff. Periodically clean cuff, tube, and cooler using a few ounces of liquid soap added to hot water in cooler. Rinse thoroughly between cooler and cuff a few times, then repeat with warm water only. Rinse completely.
MATERIAL CONTENTS: Polyurethane Nylon, Nylon, Polyether foam.
WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions of such local regulations will apply.
RX ONLY.
INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

SI UTILIZA EL CRYO/CUFF CON LA UNIDAD CRYO/CUFF IC DE AIRCAST, ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DE AIRCAST CRYO/CUFF IC.
PERFIL DEL USUARIO PREVISTO: El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporcione asistencia. El usuario debe poder leer y comprender las instrucciones, advertencias y precauciones.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: Cryo/Cuff de AirCast proporciona terapia de frío y compresión.
USO PREVISTO/INDICACIONES: Cryo/Cuff de Aircast combina la compresión focal con el frío para minimizar la inflamación y el dolor.
FRECUENCIA DE USO: Un médico autorizado debe seleccionar la duración y la frecuencia de uso, dependiendo de las necesidades de cada paciente. NO utilice este dispositivo sin haber obtenido una receta o si no comprende la receta, ya que podría no estar bajo el cuidado de un profesional médico autorizado.
CONTRAINDICACIONES: La crioterapia no debe usarse en personas con enfermedad de Raynaud u otras enfermedades vasoespásticas, hipersensibilidad al frío, menor sensibilidad de la piel, circulación local comprometida, trastornos de coagulación de la sangre, cryoglobulinemia, trastornos relacionados a hipercoagulación u otras enfermedades vasculares periféricas que causen edema periférico o circulación local deficiente, infección local comprometida, infección local del tejido, alergia al frío, hipersensibilidad al frío, lesiones previas causadas por el frío y hemoglobinuria paroxismal. No usar si es alérgico a cualquiera de los materiales que contiene este producto
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Este dispositivo no se considera suficientemente frío como para causar lesiones graves, incluida la necrosis del tejido. Debe poder revisar el estado de la piel debajo de la funda con frecuencia (NO usar el dispositivo para revisar la piel). Las personas son sensibles, pueden diversos grados de sensibilidad al frío y pueden reaccionar de diferente manera al tratamiento con frío. - Compruebe si hay aumento del dolor, ardor o si existen quemaduras, entumecimiento, hormigueo, mayor enrojecimiento, decoloración, picazón, inflamación excesiva, ampollas, erupciones o cambios en la piel debajo de la funda o alrededor del área de tratamiento. Si experimenta cualquiera de estas afecciones, interrumpa el uso de este dispositivo de inmediato y comuníquese con su médico. - El paciente no debe usar este dispositivo efectuar revisiones de las condiciones de la piel, del paciente en intervalos de 1 a 2 horas. Se debe supervisar de forma rutinaria a los pacientes, de manera habitual, monitorizaciones del paciente si se trata de niños, ancianos, pacientes incapacitados, pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, o de pacientes con menor sensibilidad cutánea o circulación debido a una mala nutrición, el uso de medicamentos (por ejemplo, beta-bloqueadores o epinefrina, narcóticos), el consumo de tabaco y alcohol. Si se producen problemas para respirar en la realiza en presencia de un médico autorizado, este debe asegurarse de que el paciente o la persona que lo cuida entiende cuánto debe vigilar. - Se recomienda descansar al menos 20 minutos de descanso entre sesiones prolongadas de crioterapia de más de 2 horas de duración. - Cuando coloque el vendaje Cryo/Cuff, no lo aplique directamente sobre la piel (por ejemplo, un paño o vendaje) entre la envoltura y la piel, y no la envuelva alrededor del tobillo o la muñeca. Ninguna parte de la envoltura debe dejarse toda la piel en ningún momento. - Compruebe si hay humedad. Si hay humedad en la funda, suspenda el tratamiento inmediatamente. No debe usar una envoltura elástica con el Cryo/Cuff. - Los vendajes que se utilizan debajo del Cryo/Cuff deben aplicarse suavemente. - Para evitar una presión excesiva al llenar el Cryo/Cuff, no levante la nevera más de 15 pulgadas (38 cm) por encima del manguito. - Reduzca la presión si siente incomodidad, entumecimiento u hormigueo en la extremidad. - El Cryo/Cuff está diseñado para un solo paciente y solamente con un paciente y utilizarse en el mismo paciente durante todo el tratamiento. - El dispositivo debe limpiarse si se utiliza en el mismo paciente durante un período de tiempo prolongado (consulte "Instrucciones de limpieza para obtener información sobre la limpieza). - Mantenga las piezas pequeñas y el material de empaque alejados de los niños y animales. Estas piezas plantean un riesgo de estrangulamiento o asfixia. - Podría no resultar seguro usar accesorios, piezas desmontables y componentes no descritos en estas instrucciones, o modificar el equipo de cualquier otra forma. - No utilizar este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto. **NOTA:** Póngase en contacto con el fabricante y con el cliente competente en caso de que se produjese un incidente grave debido al uso de este dispositivo.
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
1. **PREPARE LA HIELERA-** conecte el tubo azul a la hielera. Llene la hielera con agua hasta la línea interior, añada hielo hasta el borde de la hielera. Coloque el disco de aislamiento sobre el hielo. Coloque la tapa de la hielera y ajústela bien. Espere 5 minutos a que se asiente el hielo, agitando ocasionalmente.
2. **APLIQUE EL MANGUITO VACÍO-** cierre las solapas inferiores debajo del pie. Coloque el pie en el manguito con el talón contra la parte trasera del manguito. En caso de ser necesario, ajuste el ancho del manguito cambiando la posición de las solapas inferiores. Envuelva la cubierta del pie alrededor del mismo y sujétela con las correas (Fig. 1). Envuelva la cubierta del tobillo alrededor del mismo y ajuste las correas (Fig. 2).
3. **LLENE EL MANGUITO-** conecte el tubo azul al manguito, asegurándose de que escuche un clic/chasquido. Cuando utilice la Gravity Cryo/Cuff (no motorizada) abra la salida de aire que se encuentra en la tapa de la hielera y eleve esta última no más de 38 cm por encima del manguito (Fig. 3). Si se eleva la hielera más de 38 cm, el manguito aumentará en peso y podría causar molestias. Mantenga elevada la hielera durante aproximadamente 30 segundos, mientras se llena el manguito. Cierre la salida de aire de la tapa de la hielera. Para desconectar la hielera del manguito en este momento presionando la lengüeta metálica de conexión rápida mientras la hielera está elevada.
4. **VUELVA A ENFRIAR EL AGUA-** vuelva a conectar el tubo azul al manguito, baje la hielera por debajo del manguito y el agua tibia se drenará del manguito hacia la hielera. Espere un minuto o dos a que el agua se mezcle con el hielo y pruebe a enfriarse. Asegúrese de examinar el estado de la piel. Después, eleve la hielera y repita el proceso de llenado (consulte el paso 3).
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Después de cada uso, drene completamente el agua del manguito, el tubo y la hielera (Para drenar el tubo, elevelo mientras presiona la punta de desconexión rápida). Guarde la hielera sin la tapa para permitir que se seque. Limpie periódicamente el manguito, el tubo y la hielera con un poco de jabón líquido y agua caliente en la hielera. Haga circular la mezcla de jabón-agua por la hielera y el manguito varias veces y después repita la operación solo con agua tibia. Enjuague por completo.
COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES: Nailon con poliuretano, nailon, espuma de poliéter.
GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. En la medida en que esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.
ESÓLO CON RECETA MÉDICA.
INDICADO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST FÜR DEREN EINWANDFREIEN GEBRAUCH ERFORDERLICH.

WENN SIE DIE CRYO/CUFF MANSCHETTE MIT DER AIRCAST CRYO/CUFF IC-EINHEIT EINSETZEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN LESEN, DIE PFLEGEKRAFT DES PATIENTEN ODER DER GEBRAUCHSANLEITUNG VON AIRCAST CRYO/CUFF IC ENTHALTEN SIND.
ANWENDERPROFIL: Der vorgesehene Anwender sollte eine zugelassene medizinische Fachkraft, der Patient, die Pflegekraft des Patienten oder ein unterstütztendes Familienmitglied sein. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen können.
FUNKTIONSPRINZIP: Die AirCast Cryo/Cuff Manschette ist zur Kältetherapie und Kompression geeignet.
VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Die Aircast Cryo/Cuff Manschette kombiniert fokale Kompression mit Schwellungen und Schmerzen zu minimieren.
GEBRAUCHSHÄUFIGKEIT: Gebrauchsdauer und -häufigkeit müssen durch einen behandelnden Arzt je nach den individuellen Anforderungen des Patienten zu bestimmen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn Sie nicht über eine schriftliche Verfügung gestellt wurde oder wenn Sie das Rezept nicht verstehen, da dies zu einer Verletzung führen kann, wenn Sie nicht unter der Pflege eines zugelassenen Arztes stehen.
KONTRAINDIKATIONEN: Eine Kältetherapie (Kryotherapie) darf nicht angewendet werden bei Patienten mit Raynaud-Syndrom oder anderen Gefäßkrankheiten (vasospastischen) Erkrankungen, Kälteüberempfindlichkeit, verminderter Hautempfindlichkeit oder verminderter Durchblutung aufgrund von Mangelernährung, Arteriosklerose, Kryoglobulinämie, erhöhter Blutgerinnungsneigung (hypercoagulation/verminderte Gerinnungsstörungen) oder anderen peripheren Gefäßerkrankungen, die zu peripheren Ödemen führen, lokaler Infektion oder schlechte lokale Durchblutung vorrumachen, lokalen Gewebeinfektionen, Kälteallergien, Kälteüberempfindlichkeit, vorherige Kälteverletzungen, paroxysmale Kältehämoglobinurie. Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch reagieren. Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN:
- Die durch diese Vorrichtung verursachte Kälte kann zu schweren Verletzungen wie Gewebenekrose führen. Sie müssen in der Lage sein, den Hautzustand unter der Manschette zu überprüfen (NICHT die Manschette zu diesem Zweck entfernen). Menschen sind unterschiedlich empfindlich gegenüber Kälte und demensprechend unterschiedlich auf eine Kältetherapie. - Auf Schmerzzunahme, Brennen, Taubheit, Kribbeln, erhöhte Rötungen, Verfärbungen, Juckreiz, verstärktes Schwellungen, Blasen, Quaddeln, Rezungen oder andere Veränderungen des Hautzustands unter der Manschette oder im Behandlungsbereich achten. - Achten Stellen Sie die Verwendung der Vorrichtung umgehend ein, wenn eines dieser Symptome auftreten und konsultieren Sie Ihren Arzt. - Bei Patienten, die keine Patienten muss routinemäßig alle 1 bis 2 Stunden überwacht werden. Vorsicht ist geboten und eine routinemäßige Überwachung ist durchzuführen bei Kindern, Senioren, Gebrauch, bei Kindern, älteren, pflegebedürftigen Patienten, Personen mit schweren kardiovaskulären Erkrankungen, Personen mit verminderter Hautempfindlichkeit oder mindernder Durchblutung aufgrund von schlechter Ernährung, Medikamenten (z.B. Betablocker oder Adrenalin, Narkotika) sowie Tabak- und Alkoholkonsum. Wenn diese Anzeichen bei Patienten auftreten, die nicht unter der Aufsicht eines durchgeführt wird, muss der Arzt sicherstellen, dass der Patient oder der Betreuer mit der Durchführung einer solchen Überwachung vertraut ist. - Es wird empfohlen, eine Pause von mindestens 20 Minuten zwischen zwei jeweils 2 Stunden dauernden Kältetherapie durchgeführt wurde. - Beim Anlegen der Produktbandagen auf die Haut oder Kleidung des Patienten achten. Die Bandage darf nicht zu eng sein und ihrer Hautzufuhren und die Bandage nicht eng um den Bereich wickeln. Ein Teil der Bandage darf zu keinem Zeitpunkt lose sein. - Auf Feuchtigkeit achten. Sie auf Feuchtigkeit stoßen Sie die Verwendung der Vorrichtung umgehend ein, falls sich an der Manschette Feuchtigkeit bildet. - Verwenden Sie die Cryo/Cuff Manschette nicht in Verbindung mit einem elastischen Verband. - Verbände, die unter der Cryo/Cuff Manschette sollten nicht zu fest angelegt sein. - Beim Befüllen der Cryo/Cuff Manschette darf der Kühler nicht mehr als 38 cm über der Manschette stehen, um übermäßigen Druck zu vermeiden. - Vermingern Sie den Druck, falls Sie ein unangenehmes Gefühl, Taubheit oder Kribbeln in der Extremität verspüren. - Die Cryo/Cuff Manschette ist für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt und kann für die gesamte Dauer der Behandlung an diesem Patienten eingesetzt werden. - Das Gerät muss gereinigt werden, wenn es über einen längeren Zeitraum am selben Patienten verwendet wird (Reinigungshinweise siehe „Reinigungsanweisungen"). - Halten Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Diese Gegenstände stellen ein Erstickungs- und Strangulationsrisiko der. - Es ist möglicherweise nicht sicher, Zubehörteile, abnehmbare Teile und Komponenten zu verwenden, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, oder Produkten herzustellen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, oder Vornehmung durchgeführt wurden. - Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder der Verpackung geöffnet wurde. **HINWEIS:** Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.
GEBRAUCHSANLEITUNG:
1. **DIE KÜHLEINHEIT VORBEREITEN -** Den blauen Schlauch an der Kühleinheit anschließen. Wasser in den Schlauch im Kühlgerät hinzufügen und danach Eis geben. Den Deckel fest verschließen. Das Eis 5 Minuten absetzen lassen. Den Deckel fest auf der Kühleinheit anbringen. Fünf Minuten warten und die Kühleinheit gelegentlich schütteln, damit sich das Eis setzt.
2. **DIE MANSCHETTE LEER ANLEGEN –** Die unteren Laschen unter dem Fuß schließen. Den Fuß in die Manschette einsetzen. Die Ferse muss hinten an der Manschette anliegen. Bei Bedarf die Manschettenbreite durch Umpositionieren der unteren Laschen anpassen. Den Fußbereich um den Fuß wickeln und mit den Gurten sichern (Abb. 1). Das Knöchelteil um den Knöchel wickeln und mit dem Gurt sichern (Abb. 2).
3. **DIE MANSCHETTE FÜLLEN –** Den blauen Schlauch an die Manschette anschließen und auf ein Klick-/Einrastgeräusch achten. Öffnen Sie bei Verwendung der Gravity Cryo/Cuff (nicht motorisiert) die Luftöffnung am Deckel der Kühleinheit und heben Sie den Kühler nicht mehr als 38 cm über die Manschette an (Abb. 3). Wenn der Kühler mehr als 38 cm erhoben wird, nimmt das Gewicht der Manschette zu. Die Kühleinheit etwa 30 Sekunden lang erhoben halten, während sich die Manschette füllt. Die Entlüftungsöffnung auf dem Deckel der Kühleinheit schließen. Die Kühleinheit kann jetzt von der Manschette abgenommen werden. Dazu die Metallzunge am Schnellverschluss drücken, während der Kühler erhoben wird.
4. **DAS WASSER ABKÜHLEN –** Den blauen Schlauch wieder an die Manschette anschließen und die Kühleinheit hinter dem Patienten absenken. Den Kühler mit Eis und kaltem Wasser füllen. Den Deckel auf der Kühleinheit anbringen. Eine Minute warten, damit sich Wasser und Eis vermischen und die Flüssigkeit kühlen kann. Die Manschette wie in Schritt 3 befüllen und wieder anschließen. Den Kühler anheben und den Füllvorgang wiederholen (siehe Schritt 3).

REINIGUNGSHINWEISE: Nach jedem Gebrauch das gesamte Wasser aus der Manschette, dem Schlauch und der Kühleinheit ablaufen lassen. (Zum Entleeren des Schlauchs diesen anheben und dabei die Spitze des Schnellanschlusses drücken.) Den Deckel der Kühleinheit abnehmen, damit die Kühleinheit während der Lagerung austrocknen kann. Manschette, Schlauch und Kühleinheit regelmäßig mit Seifenwasser reinigen. Dazu ca. 100 ml Flüssigseife in heißes Wasser in die Kühleinheit einfüllen. Das Seifenwasser mehrmals durch Kühleinheit und Manschette laufen lassen, dann den Vorgang mit klarem, warmem Wasser wiederholen. Gründlich spülen.
VERWENDETE MATERIALIEN: Polyurethan Nylon, Nylon, Polyetherschaum.
GARANTIE: DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Kaufdatum. Falls und insoweit die Bedingungen dieser Gewährleistung nicht den örtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften des jeweiligen Bestimmungen.
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG.
NUR FÜR DEN GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.

NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHRENSWEISEN EINE MAXIMALE FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE E DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

SE SI USA CRYO/CUFF INSIEME ALL'UNITÀ AIRCAST CRYO/CUFF IC, ACCERTARSI DI LEGGERE E COMPRENDERE INTEGRALMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO DI AIRCAST CRYO/CUFF IC.
PROFILO UTENTE PREVISTO: Il prodotto è destinato a essere utilizzato da medici professionisti, dal paziente, dal personale di assistenza o da familiari che assistono il paziente. L'utente deve essere in grado di leggere e comprendere le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: AirCast Cryo/Cuff fornisce crioterapia e compressione.
USO PREVISTO/INDICAZIONI: Aircast Cryo/Cuff associa la compressione focale al freddo per ridurre gonfiore e dolore.
FREQUENZA D'USO: La durata e la frequenza dell'uso devono essere valutate da un medico professionista in base alle necessità dei singoli pazienti. NON utilizzare il dispositivo senza prescrizione o se non si è in grado di comprendere la prescrizione in quanto ciò può comportare lesioni. Il dispositivo può metterà abbastanza freddo da causare lesioni se utilizzato in condizioni diverse da quelle.
CONTROINDICAZIONI: la crioterapia non deve essere utilizzata su persone con malattia di Raynaud o altre patologie vasospastiche, ipersensibilità al freddo, sensibilità cutanea ridotta, circolazione locale compromessa, deficienze di coagulazione, anemia falciforme, arteriosclerosi, crioglobulinemia, stati di piercoagulabilità o altre patologie vascolari periferiche causa di ischemie o scarsa circolazione locale, infezione tessutale locale, allergia al freddo, ipersensibilità al freddo, precedente lesioni da freddo ed emoglobinuria parossistica da freddo. Non utilizzare se allergici a uno dei materiali contenuti in questo prodotto.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- Il dispositivo può rivelarsi abbastanza freddo da causare lesioni gravi, compresa la necrosi dei tessuti. Bisogna poter controllare le condizioni della propria pelle sotto il calzare (NON usarlo se non si è in grado di controllare spesso le condizioni della propria pelle). Le persone sono sensibili in modo diverso al freddo e possono reagire in vari modi alla crioterapia. - Controllare un eventuale aumento di dolore, bruciore, intorpidimento, formicolio, arrossamento, prurito, gonfiore eccessivo, pomfi, irritazioni o altre variazioni nelle condizioni della pelle esposta al calzare o nell'area di trattamento circostante. Se si avverte una qualsiasi di queste condizioni, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e rivolgersi al proprio medico. - Verificare le condizioni della pelle del paziente regolarmente, ogni 1 o 2 ore circa. Monitorando pazienti che presentano una ridotta sensibilità cutanea o circolazione ridotta a causa di cattiva nutrizione, farmaci (ad es. betabloccanti o epinefrina, narcotici), tabacco e uso di alcol. Se il monitoraggio deve avvenire in assenza di un medico professionista, assicurarsi che il paziente o chi se ne occupa sia a conoscenza del modo in cui deve effettuare il monitoraggio. - Si raccomanda almeno 20 minuti di pausa tra una sessione di crioterapia di 2 ore e l'altra. - Quando si applica la fascia del dispositivo, non applicarla direttamente sulla pelle (ad es. con un panno o una benda) tra la fascia e la pelle e non avvolgerla strettamente intorno all'area. Nessuna parte della fascia deve toccare la pelle per un qualsiasi periodo di tempo. - Verificare la presenza di umidità. Se è presente umidità sul calzare, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. - Non usare una fascia elastica con Cryo/Cuff. - Le medicazioni applicate sotto Cryo/Cuff devono essere applicate in quantità moderate. - Durante il riempimento di Cryo/Cuff, non sollevare il refrigeratore di più di 38 cm sopra il calzare per evitare una pressione eccessiva. - Diminuire la pressione in caso di fastidio, intorpidimento o formicolio dell'arto. - Cryo/Cuff è un prodotto monouso e può essere impiegato sullo stesso paziente per tutta la durata del trattamento. - Questo dispositivo deve essere pulito se utilizzato sullo stesso paziente per un periodo di tempo prolungato (vedere *"istruzioni per la pulizia" per informazioni sulla pulizia*). - Tenere le parti piccole e il materiale di imballaggio lontani dalla portata dei bambini e degli animali. Questi elementi comportano un rischio di soffocamento o strangolamento. - Potrebbe non essere sicuro utilizzare accessori, parti staccabili e componenti non descritti in queste istruzioni o apparecchiature non descritte nelle presenti istruzioni o apparecchi modificati in altri modi. - Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato e/o se la confezione è stata aperta. **NOTA:** in caso si gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo, contattare il produttore e l'autorità competente.
INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:
1. **PREPARAZIONE DEL REFRIGERATORE -** Collegare il tubo blu al refrigeratore. Aggiungere acqua nella linea all'interno del refrigeratore, quindi aggiungere ghiaccio. Inserire il disco isolante sopra il ghiaccio. Inserire bene il coperchio del refrigeratore. Attendere 5 minuti scuotendo di tanto in tanto per raffreddare il ghiaccio.
2. **APPLICAZIONE DEL GAMBALE VUOTO -** chiudere le alette inferiori sotto il piede. Inserire il piede nel gambale con il calcagno contro la parte posteriore del gambale. Se necessario, regolare la larghezza del gambale riposizionando le alette inferiori. Avvolgere il piede con la copertura plantare e fissarla con le cinghie (Fig. 1). Avvolgere la caviglia con la rispettiva copertura e fissarla con la cinghia (Fig. 2).
3. **RIEMPIMENTO DEL CALZARE -** Collegare il tubo blu al calzare, avere udirà un click/scatto. Quando si utilizza Gravity Cryo/Cuff (non motorizzato), aprire il foro di ventilazione sul coperchio del refrigeratore e sollevare il refrigeratore di non più di 38 cm sopra il calzare (Fig. 3). Se il refrigeratore viene sollevato di più di 38 cm, il calzare aumenta di volume e di peso. Tenere sollevato il refrigeratore per circa 30 secondi mentre il calzare si riempie. Chiudere il foro di ventilazione sul coperchio del refrigeratore. Ora il refrigeratore può essere scollegato dal calzare premendo l'aletta metallica sull'elemento di scollegamento rapido con il refrigeratore sollevato.
4. **ACQUA DI RAFFREDDAMENTO -** ricollegare il tubo blu al gambale, abbassare il refrigeratore sotto al gambale e scaricare l'acqua riscaldata dal gambale nel refrigeratore. Attendere uno o due minuti affinché l'acqua si mescoli con il ghiaccio e si raffreddi. Controllare le condizioni della propria pelle. Quindi sollevare il refrigeratore e ripetere il processo di riempimento (vedere *la fase 3*).

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: dopo l'uso, scaricare completamente l'acqua dal calzare, tubo e refrigeratore. (Per scaricare il tubo, sollevarlo premendo sulla punta dello scollegamento di raccordo rapido) Conservare solo con acqua fredda. Periodicamente calzare, tubo e refrigeratore con alcune gocce di sapone liquido aggiunto all'acqua calda nel refrigeratore. Far circolare la miscela di sapone e acqua tra refrigeratore e calzare per alcune volte, quindi ripetere solo con acqua calda. Sciacquare a fondo.
MATERIALI CONTENUTI: nylon di poliuretano, nylon, schiuma di poliestere.
GARANZIA: D.J.O. LLC. si impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti difettosi per materiale o lavorazione scadenti per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto. Nella misura in cui i termini della presente garanzia non risultino conformi alle normative locali, risulteranno applicabili le disposizioni di queste ultime.
SOLO SU PRESCRIZIONE.
DESTINATO ALL'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

PRODOTTO NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

EN CAS D'UTILISATION DE L'ENSEMBLE CRYO/CUFF AVEC L'UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC, VEILLER À BIEN LIRE ET COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS INCLUSES DANS LE MODE D'EMPLOI DE L'UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC.
PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient, à l'aide-soignant ou à un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre les instructions, avertissements et précautions qui figurent dans le mode d'emploi.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : L'ensemble AirCast Cryo/Cuff fournit une thérapie par le froid (cryothérapie) et la compression.
UTILISATION/INDICATIONS : L'ensemble AirCast Cryo/Cuff combine le froid et la compression pour réduire le gonflement et la douleur.
FRÉQUENCE D'UTILISATION : Un professionnel de la santé agréé doit choisir la longueur et la fréquence d'utilisation en fonction des besoins du patient. NE PAS utiliser ce dispositif sans prescription ou si vous ne bénéficiez pas d'un encadrement professionnel de l'ordonnance car cela pourrait entraîner des blessures. Le froid généré par ce dispositif étant suffisant pour causer des blessures graves, veiller à vérifier fréquemment l'état de la peau.
CONTRE-INDICATIONS : La cryothérapie ne doit pas être utilisée chez les personnes atteintes de la maladie de Raynaud ou d'autres troubles angiospastiques, d'hypersensibilité au froid, de sensibilité cutanée réduite, de circulation locale compromise, de diabète, de dyscrasie sanguine, d'antécédents de cryoglobulinémie, de troubles d'

1

2

3

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

CHCETE-LI POUŽÍVAT SYSTÉM CRYO/CUFF S JEDNOTKOU AIRCAST CRYO/CUFF IC, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU. PŘED POUŽITÍM SI VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V NÁVODU K POUŽITÍ JEDNOTKY AIRCAST CRYO/CUFF IC. PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient, pacientovi pečovatel nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen přečíst a porozumět těmto pokynům v anglickém jazyce.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: Kryomanžeta Aircast Cryo/Cuff zajišťuje léčbu studem.

ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Kryomanžeta AirCast Cryo/Cuff kombinuje řádnou kompresi s chladem, čímž minimalizuje otoky a bolesti.

FREKVENCE A DOBA POUŽITÍ: Zamýšlený pracovní režim: 20 minut jako zvolená délka a frekvence používání prostředku v závislosti na individuálních potřebách pacienta. Nepoužívejte tento zdravotnický prostředek, pokud netuji předpokládanou dobu použití, protože nebude-li použit po příliš dlouhou dobu, může dojít k poškození pokožky. Pokud jste alergičtí na kterýkoliv z materiálů obsažených v tomto produktu, nepoužívejte jej. Pokud jste alergičtí na kterýkoliv z materiálů obsažených v tomto produktu, nepoužívejte jej.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie by neměla být používána u osob s Raynaudovou chorobou, Raynaudovým vazospastickým syndromem, sníženou rychlostí cirkulace, poruchou krevního oběhu, diabetem, srpkovitou anémií, arteriosklerózou, kryoglobulinémií, hyperkoagulačními poruchami nebo jiným onemocněním periferních cév způsobujícím snížení nebo špatnou místní cirkulaci, místní hojivou infekci, chladovou alergií, přectlivělostí na chlad, předchozími omrzlinami a paroxysmální chladovou hemoglobinurií. Přesný plán použití by nám jakékoli omezení při použití tohoto produktu, nepoužívejte jej. Pokud jste alergičtí na kterýkoliv z materiálů obsažených v tomto produktu, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: - Tento prostředek může při příliš nízké teplotě způsobit vážné poškození, včetně těžkého nekrózy. Je nutné dodržovat pokyny pro použití. - Tento prostředek může způsobit POPÁLENÍ, pokud nemůžete kůži pravidelně kontrolovat. Jednotiví lidé reagují na chlad různým způsobem a jejich reakce na těchu chladem se tedy může lišit. - Vždy kontrolujte, zda se na kůži nevyskytují známky bolesti, otoků, zarudnutí, zbělování, svědění, nárůstu otoku, puchýřů, podlitin, podrážděání nebo jiných změn na kůži v místě pod manžetou nebo v okolí oblasti léčení. Pokud se u pacienta vyskytnou některé z uvedených změn, okamžitě přestaňte prostředek používat a kontaktujte svého lékaře. - Kontrolu stavu kůže pacienta provádějte dostatečně pravidelně (každých 15 minut), abyste se ujistili, že prostředek monitorujete pacienty, kteří prostředek používají, a to především dítě, starší osoby, nezpůsobilé pacienty, pacienty se závažným onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienty s diabetem a pacienty citlivosti nebo kteréhokoli z těchto stavů. - Nepoužívejte kryoterapii v případě, užívání léčiv (např. betablokátorů nebo epinefrinu, narkotiků, kouření a užívání alkoholu. Pokud tyto faktory nelze odstranit, je nutné před použitím konzultovat s lékařem. - Nepoužívejte tento prostředek, pokud jste v minulosti měli špatnou reakci na chladové zdroje. - Pokud pociťujete nepohodlí, necitlivost nebo změnu kontextu, snižte tlak. - Kryomanžeta Aircast Cryo/Cuff nesmí být použita v kombinaci s jakýmkoli jiným zdrojem tepla, jako je například horkovodní vak, a to v průběhu celé léčby. - Pokud pacient používá manžetu po delší dobu, je nutné z čistě *(informace o čistění viz „Pokyny k čištění“)* - Malé části o zadušení. Tento prostředek obsahuje malé součásti, které mohou představovat riziko udušení nebo udušení. - Používání příslušenství, součástí a náhradních dílů, které nejsou schváleny společností DJO, může být příčinou jejich nesprávného fungování a může vést k poranění. - Nepoužívejte prostředek, pokud je jakákoli součást poškozena. - Nepoužívejte elektrickou obvází spolu so zariadením Cryo/Cuff - Obvázy by so pod zariadenie Cryo/Cuff mali aplikovať zdravotníci - Pri napínaní pomôcky Cryo/Cuff nedotýkajte sa ventilu (ľ) - Nepoužívajte zariadenie Cryo/Cuff, ak sa vyššej nadmernému tlaku. - Pri akomkoľvek poote nepodráždenia, zníženi citlivosti alebo zmene kože prestaňte používať. - Zariadenie Cryo/Cuff nesmie byť na použitie len pre jedného pacienta a počas trvania liečby môže byť používané u toho istého pacienta. - Zariadenie by sa malo otrieť ak sa u toho istého pacienta používa viac ako jeden. - Pri používaní zariadenia Cryo/Cuff s ľadom buďte opatrní (informácie nájdete v časti „Pokyny k čisteniu“). - Malé časti predstavujú riziko udusenia alebo udusenia. - Používanie príslušenstva, súčastí a náhradných dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou DJO, môže mať za následok nesprávne fungovanie a môže spôsobiť zranenie. - Nepoužívajte produkt, ak bola poškodená a/alebo balenie bolo otvorené alebo poškodené. **POZNÁMKA:** Pokiaľ kvôli použitiu tohoto prostředku dojde k závažné nežiaducej udalosti, hlásenie ju výrobcu a príslušnému orgánu.

INFORMACE O APLIKACI:

1. **PŘÍPRAVTE CHLADIČ** – Připojte mrazicí hadičku k chladiči. Doplňte vodu nebo ledové kostky do chladiče, poté přidejte led až po horní okraj chladiče. Na led položte izolační disk. Chladič těsně přikryjte víkem. Vyčkejte 5 minut a občas chladič protřepejte, aby se voda ochladila.
2. **NASAĎTE PRÁZDNOU MANŽETU –** uzavřete spodní klapky pod nohou. Umístěte nohu do manžety s patou proti zadní části manžety. Je-li to nutné, nasaďte silnou manžetu přiměřeného typu. Uchopte klapek. Zabalte nohu a zajistěte pásky (obr. 1). Pásek přetáhněte přes kotník a zajistěte pásky.
3. **NAPLŇTE MANŽETU –** připojte mrazicí hadičku k manžetě. Při použití soustavy Cryo/Cuff/ (bez motorizu) otevřete vzduchový ventil na manžetě (obr. 2). Pomocí mrazicí hadičky naplňte manžetu (obr. 3). Je-li chladič zvednut výše než 38 cm, manžeta zvýší svůj objem a hmotnost.) Během plnění manžety držte chladič ve zvýšené poloze po dobu 30 vteřin. Uzavřete vzduchový ventil. Chladič může být nyní odpojen od manžety stačením kovové zarážky na rychlém odpojení, pomocí kterého chladič zvednuty.
4. **ZNOVU OCHLAĎTE VODU –** Opětovně napojte mrazicí hadičku na manžetu, snižte chladič pod manžetu a ohřátá voda přiteče z manžety do chladiče. Počkejte minutu či dvě, než se voda v chladiči ochladí a znova ochladíme. Nezabudnite zkontrolovat stav kůže. Poté nazvednite chladič k pacientovi a znovu spusťte.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ: Po použití vypusťte veškerou vodu z manžety, hadičky a chladiče. (Abyste vypustili hadičku, nadzvihnite ji a současně stlačte konec ruchtěho odpojení.) Chladič skladujte bez víka, abyste umožnili jeho usušení. Manžetu nesušte v sušičce. Čistěte pravidelně pomocí měkkého kapek tekutého mýdla rozpuštěného v horké vodě v chladič. Několikrát recyklujte vodu s mýdlem mezi chladičem a manžetou a poté postup opakujte pouze s teplou vodou. Důkladně vyplachujte.

POUŽITÝ MATERIÁL: Polyuretanový nylon, nylon, polyetherová pěna

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady, která se projeví během záruční po dobu šesti měsíců od data prodeje. V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky nevztahují, omezuje předpisy, se uplatňují tyto místní předpisy.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS.
K POUŽITÍ POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA.
NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ KAUČUKOVÝ LATEX.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCÍ VOČI PORANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NEVYHNUTNÉ PRE SPRÁVNU FUNKCIU NÁSTROJA.

AK POUŽÍVATE MANŽETU CRYO/CUFF SO ZARIADENÍM AIRCAST CRYO/CUFF IC, NEZABUDNITE SI PREČÍTAŤ VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V NÁVODE NA POUŽITIE ZARIADENIA AIRCAST CRYO/CUFF IC A POROZUMIEŤ IM.

PROFIL ZAMÝŠĽANÉHO POUŽÍVATEĽA: Zamýšľanú používateľ má byť zdravotnícky pracovník s licenciou, pacient, ošetrovateľ pacienta alebo člen rodiny poskytujúci pomoc. Používateľ musí byť schopný prečítať si pokyny v anglickom jazyku a porozumieť im.

PRINCÍP FUNGOVANIA: Kryomanžeta Aircast Cryo/Cuff umožňuje liečbu chladom a stlačením.

ÚČEL POUŽITIA / INDIKÁCIE: Zariadenie Aircast Cryo/Cuff kombinuje riadnu kompresiu s chladom, čím minimalizuje otoky a bolesti.

FREKVENCIA POUŽITIA: Dĺžku a frekvenciu používania musí určiť praktickú, keďže každý pacient je iný. Nepoužívajte tento zdravotnícky prostriedok, ak nepoužívate ho v predpokladanom čase, pretože ak nebude použitý po príliš dlhú dobu, môže dôjsť k poškodeniu pokožky. Nepoužívajte, ak ste alergickí na kterýkoľvek z materiálov použitých v tejto pomôcke, tak sa nepoužívajte.

KONTRAINDIKÁCIE: Kryoliečba by sa nemala používať u osôb s Raynaudovou chorobou, Raynaudovým vazospastickým syndrómom, zníženou rýchlosťou cirkulácie, poruchou krvného obehu, diabetes, srpkovitou anémiou, arteriosklerózou, kryoglobulinémiou, hyperkoagulačnými poruchami alebo inými ochoreniami periférnych ciev spôsobujúcimi zníženie alebo špatnou místní cirkulaci, místní hojivou infekci, chladovou alergií, přectlivělostí na chlad, předchozími omrzlinami a paroxysmální chladovou hemoglobinurií. Přesný plán použití by nám jakékoli omezení při použití tohoto produktu, nepoužívejte jej. Pokud jste alergičtí na kterýkoliv z materiálů obsažených v tomto produktu, nepoužívejte jej.

VAROVANIA A UPOZORNENIA: - Tieto pomôcka môže byť dostatočne studená na to, aby spôsobila vážne poškodenie, vrátane nekrózy. Je nutné dodržovať pokyny pre použitie. - Tento prostriedok môže spôsobiť POPÁLENINY, pokiaľ nemôžete kožu pravidelne kontrolovať. Jednotliví ľudia reagujú na chlad rôznym spôsobom a jejich reakce na těchu chladem se tedy může lišit. - Vždy kontrolujte, zda se na kůži nevyskytují známky bolesti, otoků, zarudnutí, zbělování, svědění, nárůstu otoku, puchýřů, podlitin, podrážděání nebo jiných změn na kůži v místě pod manžetou nebo v okolí oblasti léčení. Pokud se u pacienta vyskytnou některé z uvedených změn, okamžitě přestaňte prostředek používat a kontaktujte svého lékaře. - Kontrolu stavu kůže pacienta provádějte dostatečně pravidelně (každých 15 minut), abyste se ujistili, že prostředek monitorujete pacienty, kteří prostředek používají, a to především dítě, starší osoby, nezpůsobilé pacienty, pacienty se závažným onemocněním kardiovaskulárního systému, pacienty s diabetem a pacienty citlivosti nebo kteréhokoli z těchto stavů. - Nepoužívejte kryoterapii v případě, užívání léčiv (např. betablokátorů nebo epinefrinu, narkotiků, kouření a užívání alkoholu. Pokud tyto faktory nelze odstranit, je nutné před použitím konzultovat s lékařem. - Nepoužívejte tento prostředek, pokud jste v minulosti měli špatnou reakci na chladové zdroje. - Pokud pociťujete nepohodlí, necitlivost nebo změnu kontextu, snižte tlak. - Kryomanžeta Aircast Cryo/Cuff nesmí být použita v kombinaci s jakýmkoli jiným zdrojem tepla, jako je například horkovodní vak, a to v průběhu celé léčby. - Pokud pacient používá manžetu po delší dobu, je nutné z čistě *(informace o čistění viz „Pokyny k čištění“)* - Malé části o zadušení. Tento prostředek obsahuje malé součásti, které mohou představovat riziko udušení nebo udušení. - Používání příslušenství, součástí a náhradních dílů, které nejsou schváleny společností DJO, může být příčinou jejich nesprávného fungování a může vést k poranění. - Nepoužívejte prostředek, pokud je jakákoli součást poškozena. - Nepoužívejte elektrickou obvází spolu so zariadením Cryo/Cuff - Obväzy by so pod zariadenie Cryo/Cuff mali aplikovať zdravotníci - Pri napínaní pomôcky Cryo/Cuff nedotýkajte sa ventilu (ľ) - Nepoužívajte zariadenie Cryo/Cuff, ak sa vyššej nadmernému tlaku. - Pri akomkoľvek poote nepodráždenia, zníženi citlivosti alebo zmene kože prestaňte používať. - Zariadenie Cryo/Cuff nesmie byť na použitie len pre jedného pacienta a počas trvania liečby môže byť používané u toho istého pacienta. - Zariadenie by sa malo otrieť ak sa u toho istého pacienta používa viac ako jeden. - Pri používaní zariadenia Cryo/Cuff s ľadom buďte opatrní (informácie nájdete v časti „Pokyny k čisteniu“). - Malé časti predstavujú riziko udusenia alebo udusenia. - Používanie príslušenstva, súčastí a náhradných dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou DJO, môže mať za následok nesprávne fungovanie a môže spôsobiť zranenie. - Nepoužívajte produkt, ak bola poškodená a/alebo balenie bolo otvorené alebo poškodené. **POZNÁMKA:** Pokiaľ kvôli použitiu tohoto prostředku dojde k závažné nežiaducej udalosti, hlásenie ju výrobcu a príslušnému orgánu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. **PRIPRAVTE CHLADIČ –** Pripojte mrazicí hadičku k chladiču. Doplňte vodu nebo ľadové kocky do chladiče, potom pridajte ľad po horný okraj chladiča. Na ľad položte izolačný disk. Chladič tesne prikryte vekom. Vyčkajte 5 minút a občas chladič pretrepajte, aby sa voda ochladila.
2. **NASAĎTE PRÁZDNU MANŽETU –** uzavrite spodné klapky pod nohou. Umiestnite nohu do manžety s pätou proti zadnej časti manžety. Je-li to nutné, nasaďte silnou manžetu přiměřeného typu. Uchopte klapek. Zabalte nohu a zajistěte pásky (obr. 1). Pásek přetáhněte přes kotník a zajistěte pásky.
3. **NAPLŇTE MANŽETU –** Pripojte mrazicí hadičku k manžete. Pri použití sústavy Cryo/Cuff (bez motorizu) otevrite vzduchový ventil na manžete (obr. 2). Pomocou mrazicej hadičky naplňte manžetu (obr. 3). Ak je chladič zvednut výše než 38 cm, manžeta zvýší svůj objem a hmotnost.) Během plnění manžety držte chladič ve zvýšené poloze po dobu 30 vteřin. Uzavřete vzduchový ventil. Chladič může být nyní odpojen od manžety stačením kovové zarážky na rýchlom odpojení, pomocí kterého chladič zvednuty.
4. **ZNOVU OCHLAĎTE VODU –** Opätovne napojte mrazicí hadičku na manžetu, znížte chladič pod manžetou a ohřátá voda přiteče z manžety do chladiča. Počkajte minútu alebo dve, kým sa voda v chladiči ochladí a znova ochladíme. Nezabudnite skontrolovať stav pokožky. Potom zdvihnite chladič k pacientovi a znova spustite.

POKYNY PRE OHLADOM ČISTENIA: Po použití nechajte úplne odtiecť vodu z manžety, hadičky a chladiča. (Na odtečenie vody z hadičky zdvihnite hadičku pri stlačení konca rýchleho odpojenia.) Skladujte chladič bez veka, aby došlo k jeho usušeniu. Manžetu nesušte v sušičke. Pravidelne čistite pomocou mäkkého kapek tekutého mýdla rozpuštěného v horké vodě v chladič. Několikrát recyklujte vodu s mýdlem mezi chladičem a manžetou a poté postup opakujte pouze s teplou vodou. Důkladně vyplachujte.

POUŽITÝ MATERIÁL: Polyuretanový nylon, nylon, polyuretánová pena

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého alebo časti a jeho príslušenstvo z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov odo dňa predaja. V prípade, že podmienky tejto záruky nie sú v súlade s miestnymi predpismi, platia ustanovenia danej miestnymi predpismi.

LEN NA LEKÁRSKY PREDPIS.
URČENÉ LEN PRE JEDNÉHO PACIENTA.
PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PRÍRODNÝ GUMOVÝ LATEX.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

HVIS CRYO/CUFF ANVENDES SAMMEN MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHEDEN SKAL ALLE INSTRUKTIONER, DER ER ANGIVET I BRUGSANVISNINGEN TIL AIRCAST CRYO/CUFF IC LÆSES GRUNDIGT IGENNEM.

TILSIGTET BRUGERPROFIL: Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der giver hjælp. Brugeren skal være i stand til at forstå anvisningerne og forholdsregler.

PRINCIPIELT: Aircast Cryo/Cuff Cuff kombinerer kuldebehandling og komprimering.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER: Aircast Cryo/Cuff kombinerer pulsbehandlingen med hudkøl for at minimere hævelser og smerter.

ANVENDELSESTID OG -HYPPIGHED: Den tid og hyppighed, som apparatet anvendes, fastsættes af den enkelte patients behov afgøre, hvor længe og hvor hyppigt produktet skal anvendes. Denne enhed må IKKE anvendes, hvis du ikke har tænkt at overholde den tid, som produktet skal anvendes, da det kan medføre personskade. Da dette udstyr kan være kold nok til at forårsage alvorlige personskader, bør det ikke anvendes længere.

KONTRAINDIKATIONER: Kryoterapi må ikke anvendes på personer med Raynauds sygdom eller andre vaskulære sygdomme.

VARSLER OG FORHOLDSREGLER: - Dette produkt kan være kold nok til at forårsage alvorlige personskader, herunder vævsnekrose. Det skal være muligt hyppigt at kontrollere patientens tilstand under manchetten. - DVÆ IKKE anvende denne enhed, hvis du ikke kan se huden (hvis den er dækket af bandager, gips eller lignende).

- Mennesker er følsomme over for kulde på forskellige måder og kan derfor reagere forskelligt på kuldebehandling. - Kontroller, at huden ikke er øget smerte, brændende fornemmelse, følelsesløshed, prikken, øget rødme, misfarvning, kløe, øget hævelse, vabler, sårber, irritation eller andre ændringer i huden under manchetten eller i området omkring det under behandlingsområdet. Stop omgående brugen af udstyret og kontakt lægen, hvis nogen af disse symptomer forekommer. - Patienten hudtilstand skal kontrolleres rutinemæssigt med 1–2 timers mellemrum. Der skal udvises forsigtighed, hvenår rutinemæssig patientovervågning, ved brug på børn, ældre, mentalt svækkede patienter og andre særlige kardiovaskulære sygdomme, nedsat hudfølsomhed eller cirkulation på grund af dårlig ernæring, medicin (f.eks. betablokker, epinefrin og narkotika), tobaks- och alkoholanvändning. Om sådan overvågning ska ske utan narvaro av legitimerad sjukvårdspersonal, måste denne se till att patienten eller vårdaren har fått lämplig utbildning i hur produkten ska användas och hur den ska övervakas. - Det anbefales, at der er mindst 20 minutters ophør mellem kryoterapibehandling af 2 timers varighed. - Når apparatet skal vikles på huden, skal der først påføres et tørt, ikke-klæbende materiale, som ikke irriterer huden, såsom en almindelig bandage. Det kan være nødvendigt at bruge et fugtighedsgivende middel på huden, og den må ikke vikles tæt omkring patientens lemmer. Undgå at bruge for meget bandage, da det kan medføre kompression. Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med dette produkt, skal den indberettes til producenten og den kompetente myndighed.

ANVENDELSE AF SYSTEMET:

1. **KLARGØRING AF KØLEENHED** – Slut den blå slange til køleenheden. Fyld vand op til linjen indvendigt på køleenheden, og tilføj derefter is. Læg isolationsskiven ovenpå vandet. Sæt på køleenhedens låg og sæt den. Sæt køleenhedens låg på, så det slutter tæt til. Lad vandet afkøle i 5 min. under ofte omrøring.
2. **PÅSÆTNING AF DEN TOMME MANCHET** – Luk de nederste stropper under foden. Anbring foden i manchetten med hælen med den bageste del af manchetten. Om nødvendigt justeres manchettens bredde ved at bruge velcrobåndene. Sæt de nederste stropper i låsene rundt om foden og fastnes med stropperne (fig. 1) Ankelbandagen vikles rundt om foden og fastgøres med stropperne (fig. 2).
3. **OPFYLDNING AF MANCHET** – Slut den blå slange til manchetten, og tut efter et klik/tilslag. Åbn luftventilen i køleenhedens låg, og hav køleenheden stående på et fladt bord. Fyld manchetten (fig. 3). når Gravity Cryo/Cuff (ikke motoriseret) anvendes. (Hvis køleenheden løftes mere end 38 cm, vil manchettens volumen og vægt). Hold den hævede køleenhed i ca. 30 sekunder, mens manchetten fyldes. Luk luftventilen på køleenhedens låg. Køleenheden kan nu tages af manchetten ved at trykke på metalknappen på hurtigkoblingen.
4. **ZNOVA SCHLAĎTE VODU** – Znovu pripojte mrazicí hadičku k manžete, umiestnite chladič pod manžetu. Teplá voda tak bude odtekať z manžety do chladiča. Počkajte minútu alebo dve, kým sa voda v chladiči ochladí a znova ochladíme. Nezabudnite skontrolovať stav pokožky. Potom zdvihnite chladič k pacientovi a znova spustite.
4. **AFMONTERING AF MANCHET** – Slut den blå slange til manchetten igen, sænk køleenheden til under manchetten, så den kommende vand løber fra manchetten ned i køleenheden. Lad vandet blande sig med isen et par minutter for at afkøle igen. Sørg for, at køleenhedens hudtemperatur. Hold derefter køleenheden og gentag påfyldningsprocessen (se trin 3).

RENGØRINGSVEJLEDNING: Efter brug tømmes vandet helt ud af manchet, slange og køleenhed. (Slangen tømmes ved at trykke på den kombinerede kryotom, eby vuscol. Pravidelne čistite manžetu, hadičku a chladič zmesou teplej vody v chladiči a tekutého mýdla. Několikrátvyčmeřes vmeu vody a mydla mezi chladičem a manžetou a potom to zopakuje len s teplou vodou. Dôkladne vyčistíte.

MATERIALEFORTEGNELSE: polyuretanskum, nylon, polyuretanskum

GARANTI: DJO, LLC reparerer eller byter ut hele eller deler av enheten och dess tillbehör ved gallfer defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum. I den utsträckning som villkoren i denna garanti är oförenliga med lokal lovgivning, vil bestemmelserne i den pågældende lovgivning være gældende.

KUN PÅ RECEPT.
MÅ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT.
IKKE FREMSTILLET MED NATURLIGT GUMMILATEX.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER ELLER AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

OM DU ANVÄNDER CRYO/CUFF MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHETEN SKA DU LÄSA ALLA ANVISNINGAR I BRUKSANVISNINGEN TILL AIRCAST CRYO/CUFF IC OCH SE TILL ATT DU HAR FÖRSTÅTT DEM.

AVSEDD ANVÄNDARE: Den avsedda användaren ska vara legitimerad sjukvårdspersonal, patienten, patientens vårdare eller en familjemedlem som ger assistans. Användaren ska kunna läsa och förstå instruktionerna och förebyggande säkerhetsanvisningarna.

FUNKTIONSPRINCIP: AirCast Cryo/Cuff Cuff kombinerar kyla och kompression

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Aircast Cryo/Cuff kombinerar pulsbehandlingen med hudkyla för att minimera hävelser och smärter.

ANVÄNDNINGSTID OCH -FREKVENS: Hur länge och hur ofta produkten ska användas bestäms av patientens individuella behov. Använd inte denna produkt om du inte har för avsikt att använda den under den tid som produkten är avsedd att användas, eftersom det kan leda till personskador. Eftersom produkten kan vara tillräckligt kall för att orsaka allvarliga skador bör den inte användas längre än så.

KONTRAINDIKATIONER: Kryoterapi får inte användas på personer med Raynauds sjukdom eller andra vaskulära sjukdomar.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: - Denna enhet kan kyla ner så långt att det kan orsaka allvarliga skador, inklusive vävnadsnekros. Du måste kunna kontrollera hur din hud ser ut under manschetten (använd INTE produkten om du inte kan kontrollera hudens tillstånd ofta). - Använd inte denna enhet om du har känselbortfall eller om enheten ska appliceras över områden med nedsatt känsel (t.ex. bristande blodcirkulation eller epinefrin, narkotika), tobaks- och alkoholanvändning. Om sådan övervakning ska ske utan närvaro av legitimerad sjukvårdspersonal, måste denne se till att patienten eller vårdaren har fått lämplig utbildning i hur produkten ska användas och hur den ska övervakas. - Det enhetens manschetten ett minst 20 minuters avbrott bör upprepas mellan 2 timmars långa kryoterapisessioner. - Använd inte om du har känselbortfall eller om du har nedsatt känsel (t.ex. bristande blodcirkulation eller epinefrin, narkotika), tobaks- och alkoholanvändning. Om sådan övervakning ska ske utan närvaro av legitimerad sjukvårdspersonal, måste denne se till att patienten eller vårdaren har fått lämplig utbildning i hur produkten ska användas och hur den ska övervakas. - Det enhetens manschetten ett minst 20 minuters avbrott bör upprepas mellan 2 timmars långa kryoterapisessioner. - När du applicerar enhetens omslag på huden, ska du använda ett tunt, icke-irriterande material som t.ex. ett vanligt bandage. Det kan vara nödvändigt att använda en fuktighetsgivande produkt på huden, och du får inte linda för hårt runt enhetens lemmar. Undvik att linda för mycket, då det kan orsaka kompression. Om det skulle uppstå en allvarlig händelse i samband med denna produkt, ska den rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

PÅBÖRJA ANVÄNDNINGEN:

1. **FÖRBERED KYLAREN** – Anslut den blå slangen till kylaren. Fyll på vatten upp till markeringsstrecket i kylaren och fyll sedan på kylaren med is. Lägg isolationsskivan ovanpå vattnet. Sätt på kylarens lock och stäng. Vänta i 5 minuter medan du skakar på och då för att kyla vattnet.
2. **SÄTT PÅ DEN TOMMA MANSCHETTEN** – Fäst de nedre fästanordningarna under foten. Placera foten i manschetten med hälen mot den bageste del af manschetten. Om nødvendigt justeres manschettens bredde ved at bruge velcrobåndene. Sæt de nederste stropper i låsene rundt om foden og fastnes med stropperne (fig. 1) Ankelbandagen vikles rundt om foden og fastgøres med stropperne (fig. 2).
3. **FYLL MANSJETTEN** – Anslut den blå slangen till manschetten. Du skall se hur det kliknar och/eller. Öppna luftventilen på kylarens lock och håll kylaren stående på ett plant bord när du fyller på manschetten (fig. 3). Om kylaren lyfts mer än 38 cm kommer manschettens volym och vikt att öka.) Håll den upphöjda kylaren i 30 sekunder medan manschetten fylls. Stäng luftventilen på kylarens lock. Kylaren kan nu kopplas bort från manschetten genom att man trycker på metallknappen på snabbkopplingen medan kylaren är upphöjd.
4. **ÅTFYLLNING AV KYLAREN** – Återanslut den blå slangen till manschetten, sänk kylaren till under manschetten så att det varma vattnet rinner från manschetten ned i kylaren. Vänta en eller två minuter så att vattnet blandas med isen och kyls med på nytt. Var noga med att kontrollera huden innan du fortsätter kylningen och upprepa fyllningsprocessen (se steg 3).

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING: Töm manschetten, slangen och kylaren helt och låt vatten lufter även användning. (Du tömmer slangen genom att hålla den samtidigt som du trycker på spetsen på snabbkopplingen.) Förvara kylaren med locket av så att den torkar. Rengör manschetten, slangen och kylaren regelbundet med lite flytande tvål och varmt vatten i kylaren. Låt tvål/vattenblandningen rinna mellan kylaren och manschetten några gånger och upprepa därefter med bara varmt vatten. Skölj noggrant.

MATERIALINNEHÅLL: Polyuretanskum, nylon, polyuretanskum

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid gallfer defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum. I den utsträckning som villkoren i denna garanti är oförenliga med lokal lovgivning, vil bestemmelserne i den pågældende lovgivning være gældende.

KUN PÅ RECEPT.
MÅ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT.
IKKE FREMSTILLET MED NATURLIGT GUMMILATEX.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

JOS KÄYTÄT CRYO/CUFF-MANSETTIA AIRCAST CRYO/CUFF IC -LAITTEEN KANSSA, VARMISTA, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT KAIKKI AIRCAST CRYO/CUFF IC -LAITTEEN OPPAASSA ANNETUT OHJEET.

KÄYTTÄJÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET: Tuote on tarkoitettu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen, potilaan, hänen hoitajansa tai hänitä avustavien perheenjäsenen käyttöön. Käyttäjän tulee kyetä lukemaan ja ymmärtämään nämä ohjeet, varotukset ja huomiot.

TOIMINTAPERIAATE: AirCast Cryo/Cuff Cuff -ontaa kylmähoitoa ja puristusta

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖAIHEET: AirCast Cryo/Cuff Cuff -manseta yhdistää fokaalinen puristus ja kylmyys, mikä saadaan minimoitua turvotus ja kipu.

KÄYTTÖTIHEYS: Valitudetun terveydenhuollon ammattilaisen tulee valita käytön pituus ja käyttötiheys kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Älä käytä tätä laitetta pidempään kuin tarpeen, sillä se voi vaurioittaa ihoa, mikäli määräyksessä sanotaan, sillä tämä saattaa johtaa vammaan. Tämä laite voi olla niin kylmä, että se aiheuttaa vakavaa vammoja, joten muista tarkistaa ihon kunto usein.

VASTA-AIHEET: Kryoterapiaa ei tule antaa henkilöille, jolla on Raynaud'n tauti, Raynaud'n vasospastinen oireyhtymä, alentunut verenkierto, hiekentynyt ihon herkkyys, heikentynyt paikallinen verenkierto, diabetes, sirppisoluanemia, valtimonkovettumistauti, kryoglobulinemia, hyperkoagulaatiohäiriöt tai muu perifeerinen verisuonisairaus, jotka aiheuttaa iskemiaa tai heikentyntyä paikallista verenkiertoa. Kylmäallergia, aiempi kylmävaurio, paroksysmaalinen kylmän aiheuttama paleturnavamma ja kohtauksia aiheuttava kylmä hemoglobinuria. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle materiaalille. Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle materiaalille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET: - Tämä laite voi olla niin kylmä, että se voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuten kudosnekroosin. Noudata käyttöohjeita tarkistamaan kylmätyynyn alla olevan ihon kunto (ALA käytä, jos et voi tarkistaa ihosi kuntoa usein). Ihmiset ovat herkkiä kylmälle usein eri tavoin, ja he voivat siksi reagoida tähän laitteeseen eri tavoin. - Tarkista, ettei kipu, punoitus, turvotus, rakkuloita, paukamia, arsyliystä tai muita ihomuutoksia. Jos koet jotain näistä oireista, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriisi. - Potilaan