ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

IF YOU ARE USING THE CRYO/CUFF WITH THE AIRCAST CRYO/CUFF IC UNIT BE SURE YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS LOCATED IN THE AIRCAST CRYO/CUFF IC INSTRUCTIONS FOR USE.

PERFECTED DELIVERY OBJECTIVE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. User should be able to:
- Read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

OPERATING PRINCIPLE: The AirCast Cryo/Cuff provides cold therapy and compression.

INTENDED USE/INDICATIONS: The AirCast Cryo/Cuff confines focal compression with cold to minimize swelling and pain.

FREQUENCY OF USE: The length of use and frequency of use of the Cryo/Cuff are determined by the healthcare professional depending on individual patient's needs. This device can be cold enough to cause service injury if used improperly. See Warnings.

CONTRAINDICATIONS: Cryotherapy should not be used on persons with Raynaud's or other vasospastic disease; cold hypersensitivity; decreased skin sensitivity; compromised local circulation, diabetics, sickle-cell anemia, arteriosclerosis, cryoglobulinemia, hypercoagulable clotting disorders or other circulatory conditions causing hemolysis or poor local circulation, local tissue infection, cold allergy, cold hypersensitivity, previous cold injury and paroxysmal cold haemoglobinuria.

Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
- This device can be cold enough to cause serious injury, including tissue necrosis. You must be able to check your skin under the Cuff DURING USE if you suffer from any of the conditions listed below frequently. People are sensitive to cold in diverse ways and may react differently to cold treatment. Use caution and monitor the skin frequently if you experience any of the following conditions: Local increased sensitivity, tingling, numbness, irritation or other changes in skin condition under the Cuff or around the treatment area. If you experience any of these symptoms, immediately discontinue use of the device and consult your physician.
- Patient skin condition checks must occur every 1–2 hours on a routine basis. Caution must be taken by the patient, caregiver or healthcare professional when using on children, elderly, incapacitated patients, severe cardiovascular diseases, those with decreased skin sensitivity, or circulation due to poor nutrition, medications (e.g. beta blockers), diabetes, hypertonia, vascular disease and alcohol use. If such monitoring is to occur outside the presence of the licensed healthcare professional, he or she must ensure that the patient or patient caretaker understands how such monitoring is to be conducted.
- It is recommended that at least 20 minutes of cessation should be encouraged between 2 hour long or nighttime applications.
- When applying the device wrap to the skin, apply a barrier (e.g. cloth or bandage) between the wrap and your skin, when wrapping. Wrap with the device tightly, but not so tight as to cause pain or block flow to any period of time.
- Do not use if pain, pallor or pressure is present on the Cuff, immediately discontinue use of the device.
- Never use in the presence of open wounds under the Cryo/Cuff.
- Dressings used under the Cryo/Cuff should be applied lightly.
- When filling the Cryo/Cuff, do not raise the cooler higher than 15 inches (38 cm) above the cuff to avoid excessive pressure.
- Reduce pressure with any sense of discomfort, numbness or tingling of the limb.
- The Cryo/Cuff is designed for single patient use only and may be used on the same patient for the length of treatment.
- The device should be cleaned if it is used on the same patient for an extended period of time *(see "Cleaning Instruction" on back of cuff).* Treat straps through white rings and secure snugly (Fig. 1).
- **FILL CUFF** > Connect tube to the cuff, listen for a click/snap. When using the Gravity Cryo/Cuff from motorized, open air vent on cooler lid and raise cooler no more than 15 inches (38 cm) above the cuff (Fig. 2) (If the cooler is raised more than 15 inches (38 cm), the cuff will increase in volume and weight.) Hold cuff over cooler for about 30 seconds while Cuff fills with ice water (Fig. 3). The cooler can now be disconnected from cuff by pressing the metal tab on the quick-disconnect white connector and sliding it.
- **RECHILL WATER** > Reconnect the blue tube to cuff, lower the cooler below cuff, and the warmed water will flow back to the cooler (Fig. 4). Allow a minute or two for the water to mix well. Open the air vent and recfill, then raise the cooler and repeat the filling process (see step 2).

CLEANING INSTRUCTIONS: After use, completely drain water from cuff tube, and cooler. (To drain tube, elevate tube while pressing tip of quick-disconnect.) Store cooler with top off to allow drying. Periodically clean cuff, tube and cooler using a few ounces of liquid soap added to hot water in cooler. Recycle soap/water mixture between cooler and cuff a few times, then repeat with warm water only, Rinse completely.

MATERIAL CONTENTS: Polyurethane Nylon, Nylon, Polyether foam.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

SI ESTÁ UTILIZANDO EL CRYO/CUFF CON LA UNIDAD AIRCAST CRYO/CUFF IC, ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE USO DEL AIRCAST CRYO/CUFF IC.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO: El usuario al que va dirigido debe ser un profesional médico con licencia, el paciente, la persona que provee a este de cuidados primarios o los miembros de la familia que brinden asistencia. El usuario debe ser capaz de realizar lo siguiente:
- Leer, comprender y estar en condición física de llevar a cabo todas las instrucciones teniendo en cuenta las advertencias y precauciones en la información de uso.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: El AirCast Cryo/Cuff proporciona crioterapia y compresión.

USO PREVISTO/INDICACIONES: El Cryo/Cuff de Aircast combina la compresión focal con el frío para minimizar la hinchazón y el dolor.

FRECUENCIA DE USO: El profesional médico determina la duración y frecuencia de uso del Cryo/Cuff según las necesidades individuales del paciente. Este dispositivo es lo suficientemente frío como para causar lesiones graves por lo que debe asegurarse de revisar la piel frecuentemente.

CONTRAINDICACIONES: La crioterapia no debe usarse en personas con enfermedad de Raynaud u otras enfermedades vasoespásticas, hipersensibilidad al frío, menor sensibilidad de la piel, circulación local comprometida, diabetes, anemia falciforme, arteriosclerosis, crioglobulinemia, trastornos de la coagulación o otras enfermedades vasoespásticas periféricas que causan isquemia o circulación local deficiente, circulación local comprometida, infección local del tejido, alergia al frío, hipersensibilidad al frío, lesiones previas causadas por el frío y hemoglobinuria paroxismal.

No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Este dispositivo puede estar lo suficientemente frío como para causar lesiones graves, incluida la necrosis tisular. Debe poder revisar el estado de la piel debajo de la funda con frecuencia (NO usar si no puede verificar el estado de la piel) si sufre alguna de las afecciones que se enumeran a continuación. Las personas reaccionan de diferentes maneras al tratamiento con frío.
- Comprobar la piel a menudo si presenta alguno de los siguientes síntomas: Aumento local de la sensibilidad, hormigueo, adormecimiento, irritación, descoloración, picazón, aumento de hinchazón, ampollas, manchas, irritación u otros cambios en la piel debajo del vendaje o alrededor de la zona de tratamiento. Si experimenta cualquiera de estos efectos, interrumpa el uso de este dispositivo de inmediato y comuníquese con su médico.
- De manera habitual, se deben llevar a cabo revisiones del estado de las condiciones de la piel del paciente en intervalos de 1 a 2 horas. Se deben tomar medidas de precaución efectuando, de manera habitual, comprobaciones del estado de la piel del paciente, el cuidador o el profesional médico cuando se coloquen vendas cubiertas gruesas, o de pacientes con menos sensibilidad o circulación cutánea debido a una nutrición deficiente, medicamentos (por ejemplo, betabloqueadores o epinefrina, narcóticos), y el consumo de tabaco y alcohol. Si esta monitorización no se realiza en presencia de un médico autorizado, se debe asegurar que el paciente o el cuidador del paciente a cargo del paciente comprende cómo se lleva a cabo dicha monitorización.
- Se recomienda que entre las aplicaciones de 2 horas o nocturnas de duración se tomen descansos de más de 20 minutos.
- Cuando aplique la envoltura del dispositivo en la piel, aplique una barrera (por ejemplo, un paño o vendaje) entre la envoltura y la piel, y/o la envuelva alrededor del área de manera cerrada. Ninguna parte de la envoltura debe tocar la piel en ningún momento.
- Comprobar que la envoltura no esté demasiado ajustada, lo que dificulta el flujo sanguíneo, pero tampoco demasiado floja, lo que reduce la eficacia del dispositivo.
- No utilizar una envoltura elástica con el Cryo/Cuff.
- Los vendajes que se utilizan debajo del Crio/Cuff deben aplicarse suavemente.
- Para evitar una presión excesiva, al llenar el Crio/Cuff, no eleve la hielera a más de 38 cm por encima del manguito.
- Reduzca la presión si siente incomodidad, entumecimiento u hormigueo en la extremidad.
- El Cryo/Cuff está diseñado para ser utilizado solamente con un paciente y utilizarse en el mismo paciente durante todo el tratamiento.
- El dispositivo debe limpiarse si se utiliza en el mismo paciente durante un período de tiempo prolongado *(consultar "Instrucciones de limpieza" para obtener más información sobre la limpieza).*
- Mantenga las piezas pequeñas y el material de empaque alejados de niños y animales. Estos elementos pueden causar asfixia si se ingieren o inhalan.
- Podría ser necesario seguir otras precauciones, partes y materiales. Póngase en contacto con el equipo a otros equipos médicos que se utilicen para el tratamiento, o modificar el equipo de cualquier otra manera.
- NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de que se produzcan un incidente grave durante el uso de este producto.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
1. **PREPARAR LA HIELERA** > Coloque el tubo azul a la hielera. Llene la hielera con agua hasta la línea y después ahada hielo hasta el borde de la hielera. Coloque el disco de aislamiento sobre el hielo. Coloque la tapa de la hielera y cierre los pestillos laterales (Fig. 1). Gire la válvula de aire a la posición ajustable ocasionalmente.
2. **COLOQUE EL MANGUITO VACÍO:** coloque el manguito en la pantorrilla con la desconexión rápida apuntando hacia abajo (el manguito puede colocarse en la parte delantera o trasera de la pantorrilla). Pase las correas a través de las hebillas blancas y ajústelas (Fig. 1).
3. **LLENE EL MANGUITO:** conecte el tubo azul al manguito, asegurándose de que escuche un clic/chasquido. Al utilizar el Gravity Cryo/Cuff (no motorizado), abra la válvula de aire que se encuentra en la tapa de la hielera y eleve esta última no más de 38 cm por encima del manguito (Fig. 2). Si se eleva la hielera más de 38 cm, el manguito aumentará en volumen y peso. Mantenga el manguito en la hielera durante aproximadamente 30 segundos, mientras se llena el manguito. Cierre la válvula de aire de la tapa de la hielera. El manguito se mantendrá lleno durante varias horas. Desconecte el manguito presionando la lengüeta metálica de desconexión rápida mientras la retira de la hielera.
4. **VUELVA A LLENAR EL AGUA CON HIELO** > Vuelva a conectar el tubo azul al manguito. Baje el manguito por debajo del nivel del agua de la hielera. Esto hará que el agua caliente fluya de vuelta a la hielera. Espere un minuto o dos a que el agua se mezcle con el hielo y se vuelva a enfriar. A continuación, abra la válvula de aire y repita el proceso de llenado de la hielera.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Después de usarlo, drene por completo el agua del manguito, el tubo y la hielera. (Para drenar el tubo, elévelo mientras presiona la punta de desconexión rápida). Guarde la hielera con la tapa parcialmente abierta para que se seque. Limpie periódicamente el manguito, el tubo y la hielera con un paño de jabón líquido y agua caliente en la hielera. Haga circular la mezcla de jabón y agua por el tubo y el manguito varias veces y después repita la operación solo con agua tibia. Enjuague por completo.

COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES: Nailon con poliuretano, nailon, espuma de poliéter.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda la unidad o parte de ella y sus accesorios en caso de material defectuoso o fallos en la mano de obra durante el periodo de seis meses a partir de la fecha de venta.

PARA USO EXCLUSIVO PARA UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO HAY GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

WENN SIE DIE CRYO/CUFF MANSCHETTE MIT DER AIRCAST CRYO/CUFF IC-EINHEIT EINSETZEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, DIE IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG VON AIRCAST CRYO/CUFF IC ENTHALTEN SIND.

ANWENDERPROFIL: Der Anwender sollte eine zugelassene medizinische Fachkraft, der Patient, der Betreuer des Patienten oder ein betreuendes Familienmitglied sein. Der Anwender sollten in der Lage sein:
- Die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, zu verstehen und körperlich dazu in der Lage sein, diese auszuführen.

FUNKTIONSPRINZIP: Die AirCast Cryo/Cuff Manschette bietet Kältetherapie und Kompression.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Die AirCast Cryo/Cuff Manschette kombiniert fokale Kompression mit Kälte, um Schwellungen und Schmerzen zu minimieren.

FREQUENCIA DE USO: El profesional médico determina la duración y frecuencia de uso del Cryo/Cuff según las necesidades individuales del paciente. Este dispositivo es lo suficientemente frío como para causar lesiones graves, por lo que debe asegurarse de revisar la piel frecuentemente.

KONTRAINDIKATIONEN: Eine Kältetherapie (Kryotherapie) darf nicht angewendet werden bei Behandlungen bei Raynaud-Syndrom oder anderen gefäßverengenden (vasospastischen) Erkrankungen; Kälteüberempfindlichkeit; verminderter Hautempfindlichkeit; lokaler Minderdurchblutung; Diabetes, Sichelzellenanämie, Arteriosklerose, Kryoglobulinämie, erhöhter Blutgerinnungsneigung (hypercoagulierbaren Gerinnungsstörungen) oder anderen peripheren Gefäßerkrankungen, die eine Durchblutungsstörung, eine Ischämie oder Hämolyse verursachen; lokale Gewebeinfektion; Kälteallergien; Kälteüberempfindlichkeit; früheren Kälteverletzungen oder paroxysmaler kältebedingter Hämoglobinurie.

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
- Die durch diese Vorrichtung verursachte Kälte kann zu schweren Verletzungen wie Gewebenekrose führen. Sie müssen in der Lage sein, während der Verwendung unter der Manschette die Haut zu überprüfen, wenn Sie bei Hautzustand nicht regelmäßig überprüfen können). Menschen reagieren unterschiedlich auf Kälte und dementsprechend auf eine Kältetherapie. Wenden Sie die Anwendung vorsichtig an und überwachen Sie die Haut regelmäßig, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken: Lokale erhöhte Empfindlichkeit, Kribbeln, erhöhte Taubheit, Kribbeln, erhöhte Reizbarkeit, Verfärbungen, Juckreiz, vermehrte Schwellung, Blasenbildung, Flecken, Reizungen oder andere Veränderungen des Hautzustands unter der Manschette oder im Behandlungsbereich ist zu achten. Stellen Sie die Verwendung der Vorrichtung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt, wenn diese Symptome auftritt.
- Sie Ihren Arzt.
- Die Haut des Patienten muss regelmäßig alle 1–2 Stunden überprüft werden. Vorsicht ist geboten und eine routinemäßige Überwachung ist durchzuführen während des Gebrauchs bei Kindern; älteren, gebrechlichen oder bettlägerigen Patienten, schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit verminderter Hautempfindlichkeit oder Minderdurchblutung aufgrund schlechter Ernährung, Medikamenten (z. B. Betablocker), Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßerkrankungen, Alkoholkonsum. Wenn diese Überwachung außerhalb der Anwesenheit des behandelnden Arztes durchgeführt wird, muss der Arzt sicherstellen, dass der Patient oder Betreuer weiß, wie diese Durchführung und die Anwendung der Vorrichtung vorzunehmen ist.
- Es wird empfohlen, zwischen 2-stündigen Kältetherapieanlegungen eine Pause von mindestens 20 Minuten einzuhalten.
- Beim Anlegen der Produktbandagen auf die Haut eine Schutzschicht (z. B. Stoff oder Verband) zwischen der Bandage und der Haut anbringen. Die Bandage fest, aber nicht so fest, dass Schmerzen auftreten oder der Blutfluss für einen längeren Zeitraum behindert wird.
- Überprüfen Sie auf Schmerzen, Blässe oder Druckgefühl unter der Manschette. Sollte eines dieser Symptome auftreten, die Manschette sofort abnehmen.
- Niemals in Gegenwart offener Wunden unter dem Kryo/Cuff verwenden.
- Verbände, die unter Kryo/Cuff getragen werden, sollten leicht aufgetragen werden.
- Füllen Sie die Kühlbox nicht mehr als 38 cm über die Manschette, um einen übermäßigen Druck zu vermeiden.
- Reduzieren Sie den Druck, wenn Sie Unbehagen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln in der Extremität verspüren.
- Die Kryo/Cuff ist ausschließlich für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt und kann für die gesamte Dauer der Behandlung an demselben Patienten eingesetzt werden.
- Wenn die Vorrichtung über längere Zeit am selben Patienten verwendet wird, muss sie gereinigt werden *(Reinigungsanweisungen siehe „Reinigungsanweisungen").*
- Kleinteile und Verpackungsmaterialien von Kindern und Tieren fernhalten. Diese Gegenstände stellen ein Erstickungsrisiko dar, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Es ist möglicherweise nicht sicher, Zubehörteile, abnehmbare Teile und Materialien zu verwenden, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind. Verwenden Sie keine Zubehörteile, abnehmbare oder Vorrichtung anderweitig zu modifizieren.
- HINWEIS: Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

GEBRAUCHSANLEITUNG:
1. **DIE KÜHLEINHEIT VORBEREITEN** > Den blauen Schlauch an die Kühleinheit anschließen. Wasser in den Schlauch einfüllen, bis der Kühlbehälter bis zur Linie gefüllt ist. Eis in den Kühlgriff geben. Das Eis mit der Isolierscheibe abdecken. Den Deckel fest auf der Kühleinheit anbringen. Fort Minuten warten und die Kühleinheit gegenüber der Schulter, um das Wasser zu kühlen.
2. **DIE MANSCHETTE LEER ANLEGEN** > Die Manschette so am Unterschenkel anlegen, dass sich der Schnellkupplungsanschluss nach unten zeigt (Sie können auch vorne oder hinten am Unterschenkel angelegt werden). Die Gurte durch die weißen Ringe führen und gut anziehen (Abb. 1).
3. **DIE MANSCHETTE FÜLLEN** > Den blauen Schlauch an die Manschette anschließen und auf ein Klick-/Einrastgeräusch achten. Öffnen Sie bei Verwendung der Gravity Cryo/Cuff Manschette (nicht motorisiert) das Luftventil auf dem Deckel der Kühleinheit und heben Sie die Kühleinheit nicht mehr als 38 cm über die Manschette (Abb. 2). (Wenn die Kühleinheit mehr als 38 cm angehoben wird, vergrößert sich das Volumen und Gewicht der Manschette zu.) Die Kühleinheit etwa 30 Sekunden lang so halten, bis sich die Manschette füllt. Die Entlüftungsöffnung auf dem Deckel der Kühleinheit schließen. Die Kühleinheit kann jetzt von der Manschette abgenommen werden. Dazu die Metallzunge auf dem Schnellanschluss drücken und den Schlauch nach zeigenhöhe ist.
4. **DAS WASSER ABKÜHLEN** > Den blauen Schlauch wieder an die Manschette anschließen und die Kühleinheit unter die Manschettenhöhe absenken. Das erwärmte Wasser fließt von der Manschette in die Kühleinheit. Ein bis zwei Minuten lang warten, damit sich das Wasser mit dem Eis vermischen und abkühlen kann. Dann die Kühleinheit anheben und den Füllvorgang wiederholen *(siehe Schritt 3).*

REINIGUNGSANWEISUNGEN: Den Schlauch, den gesamte Wasser aus der Manschette, dem Schlauch und der Kühleinheit ablassen lassen. (Zum Entleeren des Schlauchs diesen anheben und gleichzeitig die Spitze des Schnellanschlusses drücken.) Den Deckel der Kühleinheit abnehmen, damit die Kühleinheit während der Lagerung austrocknen kann. Manschette, Schlauch und Kühleinheit regelmäßig reinigen. Dazu ein bis zwei Esslöffel flüssige Seife in warmes Wasser in der Kühleinheit einfüllen. Das Seifenwasser mehrmals durch Kühleinheit und Manschette laufen lassen, dann den Vorgang mit klarem, warmem Wasser wiederholen. Gründlich spülen.

VERWENDETE MATERIALIEN: Polyurethan-Nylon, Nylon, Polyetherschaum.

GEWÄHRLEISTUNG: DJO, LLC gewährleistet bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

SE SI USA CRYO/CUFF INSIEME ALL'UNITÀ AIRCAST CRYO/CUFF IC, ACCERTARSI DI LEGGERE E COMPRENDERE INTEGRALMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO DI AIRCAST CRYO/CUFF IC.

PROFILO UTENTE: L'utente cui è prodotto è destinato deve essere un medico professionista, il paziente, la persona che fornisce cure del paziente o un familiare che lo assiste. L'utente deve essere in grado di:
- leggere, comprendere e seguire le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nelle informazioni per l'uso.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: AirCast Cryo/Cuff fornisce crioterapia e compressione.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Aircast Cryo/Cuff associa la compressione focale al freddo per ridurre al minimo il gonfiore e il dolore.

FREQUENZA D'USO: La durata e la frequenza d'uso di Cryo/Cuff vengono stabilite dal terapista professionista, sulla base delle esigenze specifiche del paziente. Il dispositivo può rivelare abbastanza freddo da causare lesioni gravi; verificare spesso le condizioni della pelle.

CONTROINDICAZIONI: La crioterapia non deve essere utilizzata su persone con malattia di Raynaud o altre patologie vasospastiche, ipersensibilità al freddo, sensibilità ridotta della pelle, circolazione locale compromessa, diabete, anemia falciforme, arteriosclerosi, crioglobulinemia, disturbi della coagulazione o altre patologie vascolari periferiche causa di ischemia o scarsa circolazione locale, infezione tissutale locale, allergia al freddo, ipersensibilità al freddo, precedenti lesioni da freddo ed emoglobinuria parossistica da freddo.

Non utilizzare se si è allergici a una qualsiasi dei materiali contenuti in questo prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- Il dispositivo può rivelarsi abbastanza freddo da causare lesioni gravi, compresa la necrosi dei tessuti. Assicurarsi di poter controllare la cute sotto il bendaggio DURANTE L'USO se si soffre di una delle condizioni elencate di seguito. Le persone sono sensibili al freddo in modi diversi e possono reagire in modo differente al trattamento con il freddo. Controllare con attenzione e frequentemente la cute se si manifestano uno dei seguenti sintomi: Aumento locale della sensibilità al freddo, sensazione di formicolio, intorpidimento, irritazione o altre alterazioni della cute sotto il bendaggio o nella zona del trattamento. Se si manifestano uno di questi effetti, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e rivolgersi al proprio medico.
- Verificare le condizioni della cute del paziente regolarmente, ogni 1-2 ore di routine. Prestare attenzione, monitorando periodicamente il paziente, in caso di uso prolungato su bambini, anziani, invalidi o pazienti affetti da gravi malattie cardiovascolari o sensibilità cutanea ridotta o circolazione cutanea a causa di malnutrizione, farmaci (ad es. betabloccanti o epinefrina, narcotici), fumo e uso di alcol. Se il monitoraggio deve avvenire in assenza di un medico professionista, assicurarsi che il paziente o chi se ne occupa sia a conoscenza del modo in cui effettuare il monitoraggio.
- Si raccomandano pause di più di 20 minuti ogni interruzione tra una sessione di crioterapia di 2 ore o l'altra.
- Quando si applica la fascia del dispositivo alla pelle, applicare una barriera (ad es., un panno o una bendina) tra la fascia e la pelle e non avvolgere strettamente intorno all'area. Nessuna parte della fascia deve toccare la pelle per un qualsiasi periodo di tempo.
- Controllare che la fascia non sia troppo stretta, che ostacola il normale flusso di umidità, intorpisce completamente la gamba, ma non così larga da ridurre l'efficacia del dispositivo.
- Non usare una fascia elastica insieme a Cryo/Cuff.
- Le medicazioni utilizzate sotto Crio/Cuff devono essere applicate in quantità moderate.
- Durante il riempimento di Cryo/Cuff, non sollevare il refrigeratore di più di 38 cm sopra il calzare per evitare una pressione eccessiva.
- Diminuire la pressione ai primi segni di disagio, intorpidimento o formicolio dell'arto.
- Cryo/Cuff è progettato per l'uso su un singolo paziente durante l'intero periodo di trattamento.
- Questo dispositivo deve essere pulito se usato sullo stesso paziente per un periodo di tempo *prolungato (vedere "Istruzioni per la pulizia" per informazioni sulla pulizia).*
- Tenere i componenti piccoli e il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Questi elementi comportano un pericolo soffocamento o strangolamento.
- Potrebbe non essere sicuro utilizzare accessori e parti e materiali non descritti in questo manuale. Non collegare il dispositivo ad altre apparecchiature non descritte nella presenti istruzioni o apparecchi modificato in altri modi.
- NOTA: In caso di grave incidente devono essere informati dell'uso di questo dispositivo, contattare il produttore e l'autorità competente.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE:
1. **PREPARAZIONE DEL REFRIGERATORE** > Collegare il tubo blu al refrigeratore. Aggiungere acqua nella linea all'interno del refrigeratore, quindi aggiungere ghiaccio nella parte superiore del refrigeratore. Posare il disco isolante sopra il ghiaccio. Chiudere il coperchio del refrigeratore. Attendere 5 minuti accostato la valvola di sfiato sul coperchio per consentire l'aerazione.
2. **APPLICARE IL BENDAGGIO VUOTO** > posizionare la polpaccetta con la fascia con raccordo di scollegamento rapido rivolto verso il basso (la fascia può essere posizionata davanti o dietro al polpaccio). Infilare le cinghie nelle asole bianche e fissarle in modo sicuro (Fig. 1).
3. **RIEMPIMENTO DEL CALZARE** > Collegare il tubo blu al calzare, assicurandosi di sentire un clic/scatto. Quando si usa il Gravity Cryo/Cuff (non motorizzato), aprire la valvola di sfiato sul coperchio del refrigeratore e sollevare il refrigeratore di non più di 38 cm sopra il calzare (Fig. 2). (Se il refrigeratore viene sollevato di più di 38 cm, il calzare aumenta di volume e di peso). Tenere sollevato il refrigeratore per circa 30 secondi mentre il calzare si riempie. Chiudere il foro di ventilazione sul coperchio del refrigeratore. Il calzare rimarrà gonfio per diverse ore. Il refrigeratore può essere scollegato dal calzare premendo l'aletta metallica sull'estremità di scollegamento rapido con il refrigeratore sollevato.
4. **ACQUA DI RAFFREDDAMENTO** > Ricollegare il tubo blu al calzare, abbassare il refrigeratore sotto al calzare e scaricare l'acqua riscaldata dal calzare nel refrigeratore. Attendere uno o due minuti affinché l'acqua e il ghiaccio si mescolino e si raffreddi, quindi sollevare il refrigeratore e ripetere il processo di riempimento *(vedere la fase 3).*

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: dopo l'uso, scaricare completamente l'acqua da calzare, tubo e refrigeratore. (Per scaricare il tubo, sollevarlo premendo sulla punta dell'elemento di scollegamento rapido.) Conservare il refrigeratore con il coperchio parzialmente aperto per consentirne l'asciugatura. Pulire periodicamente calzare, tubo e refrigeratore con alcune gocce di sapone liquido aggiunto all'acqua calda nel refrigeratore. Far circolare la miscela di sapone e acqua tra refrigeratore e calzare per alcune volte, quindi ripetere solo con acqua calda. Sciacquare a fondo.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE: nylon di poliuretano, nylon, schiuma di poliestere.

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinnovati entro sei mesi dalla data di acquisto.

PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO DI MASSIMA COMPATIBILITÀ DI FUNZIONE, RESISTENZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

EN CAS D'UTILISATION DE L'EMBRASSE CRYO/CUFF AVEC L'UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC, VEILLER À BIEN LIRE ET COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS INCLUSES DANS LE MODE D'EMPLOI DE L'UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC.

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE : Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :
- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions d'emploi fournis dans le mode d'emploi.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : L'embrasse AirCast Cryo/Cuff fournit une thérapie par le froid (cryothérapie) et la compression.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : L'embrasse AirCast Cryo/Cuff combine le froid et la compression focale pour minimiser le gonflement et la douleur.

FRÉQUENCE D'UTILISATION : La durée et la fréquence d'utilisation d'Embrasse Cryo/Cuff sont déterminées par le professionnel de la santé en fonction des besoins de chaque patient. Le froid généré par ce dispositif est suffisant pour causer des lésions. Consulter régulièrement la peau.

CONTRE-INDICATIONS : La cryothérapie ne doit pas être utilisée chez les personnes atteintes de la maladie de Raynaud ou d'autres maladies angiospasmiques, d'hypersensibilité au froid, de sensibilité cutanée réduite, de circulation locale compromise, de diabète, de dyscrasie sanguine, d'artériosclérose, de cryoglobulinémie, de troubles d'hypercoagulation ou autres maladies vasculaires périphériques provoquant un ischémie ou une mauvaise circulation locale, d'infection locale d'origine tissulaire, d'une allergie au froid, d'une hypersensibilité au froid, de lésions antérieures dues au froid et d'une hémoglobinurie paroxystique due au froid.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PRÉCAUTION :
- Le froid généré par ce dispositif est suffisant pour provoquer des blessures graves, notamment la nécrose des tissus. Vous devez être en mesure de vérifier votre peau sous l'embrasse (NON PAS utiliser si vous ne pouvez pas vérifier fréquemment l'état de la peau). Les personnes ont une sensibilité différente au froid et réagissent différemment au traitement par le froid. Faites attention, surveillez fréquemment votre peau si vous présentez l'un des symptômes suivants : augmentation de la douleur, brûlure, engourdissement, picotement, rougeur, démangeaison, irritation, cloques, taches, gonflement, ou autres changements, décolorations, irritation ou autres changements de l'état cutané sous l'embrasse ou autour du site de traitement. Si l'une des situations ci-dessus survient, interrompre immédiatement l'utilisation du dispositif et apporter un médecin.
- Des vérifications de l'état de la peau du patient doivent être effectuées régulièrement toutes les heures ou toutes les deux heures. Veiller à surveiller régulièrement le patient lorsque ce dernier est un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée ou souffrant de maladies cardiaques graves, de sensibilité cutanée réduite ou d'une mauvaise circulation cutanée due à une mauvaise alimentation, à la prise de médicaments (par exemple, bêtabloquants), au diabète, à l'hypertonie, à une maladie vasculaire ou à la consommation d'alcool. Si la surveillance a lieu en dehors de la présence d'un professionnel de la santé qualifié, ce dernier doit s'assurer que le patient ou la personne qui s'occupe du patient comprend la manière dont une telle surveillance doit être effectuée.
- Il est recommandé de laisser un intervalle d'au moins 20 minutes entre deux séances de criothérapie d'une durée de 2 heures.
- Lors de l'application de l'enveloppe du dispositif sur la peau, mettre en place une barrière (par ex. tissu ou bandage) entre l'enveloppe et la peau, et ne pas l'enrouler étroitement autour de la zone. Aucune partie de l'enveloppe ne doit, à aucun moment, toucher la peau.
- Vérifier l'absence de douleur, de pâleur ou de pression sous l'embrasse immédiatement l'utilisation du dispositif.
- Ne pas utiliser de bandage élastique avec l'embrasse Cryo/Cuff.
- Les pansements utilisés sous l'embrasse Cryo/Cuff

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

OM DU ANVÄNDER CRYO/CUFF MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHETEN SKA DU LÄSA ALLA ANVISNINGAR I BRUKSANVISNINGEN TILL AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHET OCH SE TILL ATT DU HAR FÖRSTÅTT DEM.

AVSEDD ANVÄNDARE: Systemet är avsett att användas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren ska kunna:

- Läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och förskrivningsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

FUNKTIONSPRINCIP: AirCast Cryo/Cuff ger köldbehandling och kompression.

AVSEDD ANVÄNDNINGSINDIKATION: Aircast Cryo/Cuff kombinerar fokal kompression med kyla för att minimera svullnad och smärta.

ANVÄNDNINGSFÖRBEREDELSER: Lunga och hur ofta Cryo/Cuff ska användas bestäms av vårdpersonen med hänsyn till den enskilda patientens behov. Denna enhet kan kylas när så mycket att den orsakar allvarlig skada. Var därför noga med att kontrollera patientens hud.

KONTRAINDIKATIONER: Kryoterapi får inte användas på personer med Raynauds eller annan köldallergi eller kryoglobulinemi, överkänslighet mot kyla, nedsatt hudkänslighet, försämrad lokal cirkulation, diabetiker, sickelcellsanemi, arteriosklerosis, kryoglobulinemi, hypertensogenfarande kvagulationsrubbningar eller andra perifera kärlsjukdomar om det inte finns särskilt skäl för detta (vissa cirkulation, lokal värmeöverkänslighet, köldallergi, överkänslighet mot kyla, tidigare köldskada och paroxysmal kölderhemoglobinuri).

Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Denna enhet har en lång slang för att den ska användas tillsammans med AirCast Cryo/Cuff IC-enheten. Om enheten används med en annan kylenhet kan slangen bli för kall och orsaka allvarlig skada. Använd inte enheten med en annan kylenhet än AirCast Cryo/Cuff IC-enheten.
- Kontrollera att du använder på rätt sida av kroppen. Kontrollera att slangen inte är knäckt eller tillplattad innan du påbörjar behandlingen.
- Kontrollera med användaren på ökad smärta, sveda, domningar, stickningar, ökad rodnad, misstänkning, blåsa, ökad svullnad eller förändring i hudens färg. Om någon av dessa symptom uppstår ska slangen och manschetten eller runt behandlingsområdet. Om du upplever något av dessa tillstånd ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta din läkare.
- Kontrollera att patienten har mätte gränsvärdena var 1–2 timme. Förskjutningen måste säkras genom att underkroppen och manschetten är ordentligt fixerade. Om patienten är ett barn, äldre, oförmögna patienter, svårare hjärt- och kärlsjukdomar, patienter med minskad hudkänslighet eller cirkulation på grund av dålig näringsstatus, diabetes, perifer kärlsjukdom, sjukdomar eller epilepsi, narkotikaf, tobaks- och alkoholanvändning. Om sådan övervakning ska ske utan närvaro av legitimerad sjukvårdsperson, måste denne se till att patienten eller den som vårdar patienten förstår hur sådan övervakning ska ske.
- Det rekommenderas att minst 20 minuters avbrott bör upprinnelse mellan 2 timmars långa behandlingsperioder.
- När du applicerar enheten omslag på huden ska du applicera en barrär (t.ex. tyg eller bandage) mellan bandaget och huden och inte direkt på huden. Ingen del av bandaget får komma i kontakt med huden under någon tid.
- Kontrollera om det finns förhöjningar hårt. Om det finns fukt på manschetten ska du omedelbart avbryta användningen.
- Använd inte ett elastiskt omslag tillsammans med Cryo/Cuff.
- Förband eller kompresser som används under Cryo/Cuff ska appliceras löst.
- När Cryo/Cuff fylls får kylaren inte höjas mer än 38 cm över manschetten för att undvika för högt tryck.
- Lätta på trycket vid minsta obehag, domningar eller stickningar i extremiteten.
- Cryo/Cuff är inte lämplig för användning på en patient, men kan användas på samma patient under hela behandlingstiden.
- Produkten ska rengöras om den används av samma patient under en längre tid *(se anvisningar "Anvisningar för rengöring" för information om rengöring)*.
- Förvara isolerade och förpackningsmaterial på betryggande avstånd från små barn och djur. Dessa artiklar utgör en kvävnings- eller strypningsrisk.
- Den kan vara irritationsbenägen. Undersök bandagera delar och material, koppla samman produkten med annan utrustning som inte beskrivs i dessa anvisningar eller på något sätt modifiera denna produkt.
- OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

INFORMATION OM ANVÄNDNING:

1. **FÖRBEREDELSER** – Anslut den två slangen till kylaren. Fyll på vatten upp till maxlinjeindikatorn i kylaren och sätt vatten på kylaren med lock. Låg isstarnpåsen ovanpå isen. Om så önskas, tillsätt is. Obs! Använd ej varmt vatten. Vänta i 5 minuter medan is smälter så att det får tid att kyla vattnet.
2. **SÄTT PÅ DEN TOMMA MANSCHETTEN** – Placera manschetten på vaden så nära knäet som möjligt. Se till att patienten placerar på vaden så nära knäet som möjligt. Se till att patienten placerar på vaden så nära knäet som möjligt. Se till att patienten placerar